

文章编号: 1000-5692(2003)01-0106-02

浙江省鸟类新记录

朱 曦

(浙江林学院 生命科学学院, 浙江 临安 311300)

摘要: 2002年6月12日在浙江杭州市萧山区采到小鸚鵡 *Centropus toulou bengalensis* 雄性亚成鸟标本, 为浙江省鸟类新记录。参6

关键词: 鸟纲; 小鸚鵡; 杭州; 浙江

中图分类号: Q959.7 **文献标识码:** A

小鸚鵡 *Centropus toulou bengalensis* 在浙江的分布曾有报道^[1], 但未采集到标本。作者于1985~1997年间在杭州地区作鸟类调查时曾在笕桥、余杭等地多次见到该鸟, 后于2002年6月12日在杭州萧山采到雄性标本一只。现将形态特征记述如下。

1 形态特征和习性

小鸚鵡的头、颈、上背及下体羽毛黑色, 具深蓝色光泽, 羽干硬而成刺状, 呈亮黑色。头至背羽有淡棕白色羽干纹和黑色点斑。下背和尾上覆羽黑色具蓝色光泽, 有细小的黑色或栗褐色斑纹。尾羽黑色, 具绿色金属光泽和窄的白色尖端, 亦密布栗褐色横斑。肩部和两翅栗褐色, 飞羽端部色较深呈褐色, 羽干栗红色, 翼下覆羽为红褐色。虹膜深红色, 嘴峰黑色, 脚铅黑色。

量衡度为: 雄性 ♂ (1), 体质量 142.6 g, 全长 364.0 mm, 嘴峰长 20.2 mm, 翅长 182.0 mm, 尾长 205.0 mm, 跗蹠长 41.1 mm。

平时多单独在草灌丛中觅食, 常停栖芦苇等顶部和地面, 性较机警, 有时作短距离飞行。胃检食物有绿螽斯4只。

小鸚鵡华南亚种, *C. t. bengalensis* 在杭州为夏候鸟。

2 地理分布及亚种分化

文献[2]报道, 小鸚鵡国内留居安徽南部及长江中下游以南地区, 西至云南西北部。国外分布在印度、菲律宾及印度尼西亚等国。

鸚鵡过去归列杜鹃科中, 由于该种类营巢和育雏习性明显与杜鹃不同, 不具寄生性, DNA结构也不同, 因此近年鸟类学家单独列鸚鵡科 Centropodidae^[3]。

关于小鸚鵡的亚种分化, 鸟类学家的意见不一。以往国内著作中多采用郑作新的分类法, 把 *C. toulou*, *C. bengalensis* 和 *C. grillii* 等3种作为同一个种的不同亚种, 中国分布的小鸚鵡为华南亚种 *C. toulou bengalensis*^[4,5]。

近些年 Howard and Moore^[5], De Schauensee^[6] 仍然认为上述3种的独立性, 其中分布在马达加斯加

收稿日期: 2002-07-15; 修回日期: 2002-10-20

作者简介: 朱曦(1944-), 男, 浙江金华人, 教授, 从事脊椎动物区系、生态学和保护生物学研究。

©1994-2017 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. <http://www.cnki.net>

的马岛小鸦鹃 *Centropus toulou* 有 *C. t. toulou*, *C. t. insularis* 和 *C. t. assumptionis* 等 3 个亚种。主要分布在东洋界的小鸦鹃 *Centropus bengalensis* 有 *C. b. bengalensis*, *C. b. chamngi*, *C. b. javanensis* 和 *C. b. mendius* 等 4 个亚种。分布在非洲的黑胸鸦鹃 *Centropus grillii* 为单型种, 无亚种分化。依此, 分布在中国的小鸦鹃应属于指名亚种 *C. b. bengalensis*。

约翰·马敬能等^[3]认为中国分布的小鸦鹃为 *C. b. lignator* 亚种, 分布于北纬 27°以南和安徽、台湾及海南岛, 为常见留鸟。

由于小鸦鹃 *C. b. lignator* 分布区与华南亚种 *C. t. bengalensis* 分布区基本相同, 是否为同一物种值得进一步研究。

参考文献:

- [1] 朱曦, 杨春江. 浙江鸟类研究[J]. 浙江林学院学报, 1988, 5(3): 243-258.
- [2] 郑作新. 中国动物志·鸟纲: 第 6 卷[M]. 北京: 科学出版社, 1991.
- [3] 约翰·马敬能, 卡伦·菲利普斯, 何芬奇. 中国鸟类野外手册[M]. 长沙: 湖南教育出版社, 2000.
- [4] Cheng T H. *A Synopsis of the Avifauna of China* [M]. Beijing: Science Press, 1987.
- [5] Howard R, Moore A. *A Complete Checklist of the Birds of the World* [M]. London: Academic Press, 1991.
- [6] Meyer de Schauensee R. *Birds of China* [M]. Washington: Smithsonian Institution Press, 1984.

A new record of *Centropus toulou bengalensis* in Zhejiang

ZHU Xi

(Faculty of Life Science, Zhejiang Forestry College, Lin'an 311300, Zhejiang, China)

Abstract: A new record of *Centropus toulou bengalensis* has been made in Hangzhou City of Zhejiang, China. The bird is male and 142.6 g in weight. It is 364.0 mm long in body, 20.2 mm in neb, 182.0 mm in wing, 205.0 mm in tail and 41.1 mm in tarsometatarsus.

Key words: Aves; *Centropus toulou bengalensis*; Hangzhou; Zhejiang

《中国林学（英文版）》2003 年变更为季刊

经国家教育部和新闻出版总署批准,《中国林学（英文版）》从 2003 年起改出季刊,季末月出版。《中国林学（英文版）》将力求从理论及实践 2 个方面反映国内外林业发展的前沿及现状,其主要内容包括森林生物、森林遗传育种、森林生态、森林病虫害、森林经营与管理、木材科学与技术等学科。欢迎广大作者投稿。

联系地址: 100083 北京林业大学《中国林学（英文版）》编辑部。

Email: vlsun2002@bjfu.edu.cn. Tel: 010-62337673-809 (806)。